Bayesianische FDR (Teil 1)

Mareile Große Ruse

Seminar Multiples Testen

08.11.2010

Übersicht

- Wiederholung Bayes-Theorem
- False Discovery Rate

Übersicht

- Wiederholung Bayes-Theorem
- False Discovery Rate
- Empirischer Bayes-Ansatz

Übersicht

- Wiederholung Bayes-Theorem
- False Discovery Rate
- Empirischer Bayes-Ansatz
- Alternative: Nichtparametrisches Bayessches Modell

Übersicht

- Wiederholung Bayes-Theorem
- False Discovery Rate
- Empirischer Bayes-Ansatz
- Alternative: Nichtparametrisches Bayessches Modell
- Ausblick

Übersicht

- Wiederholung Bayes-Theorem
- False Discovery Rate
- Empirischer Bayes-Ansatz
- Alternative: Nichtparametrisches Bayessches Modell
- Ausblick

Bedingte Wahrscheinlichkeit

$(\Omega, \mathfrak{A}, \mathbb{P})$ W-Raum, $A, B \in \mathfrak{A}$, $\mathbb{P}(B) > 0$.

Definition

Die *bedingte Wahrscheinlichkeit* von A gegeben B ist definiert als

$$\mathbb{P}[A | B] = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

$$\underbrace{\mathbb{P}[A | B]}_{\text{a posteriori Wkeit von A}} = \frac{\mathbb{P}[B | A] \overbrace{\mathbb{P}(A)}^{\text{a priori Wkeit von A}}}{\mathbb{P}(B)}$$

Bayes-Theorem für bedingte Wahrscheinlichkeiten

Theorem (Bayes-Theorem)

$A_1, \dots, A_n \in \mathfrak{A}$ mit $\sum_{i=1}^n A_i = \Omega$ und $\mathbb{P}(A_i) > 0$.

$$\mathbb{P}[A_i | B] = \frac{\mathbb{P}[B | A_i] \mathbb{P}(A_i)}{\sum_{k=1}^n \mathbb{P}[B | A_k] \mathbb{P}(A_k)}$$

Bedingte Dichten

$\theta : (\Omega, \mathfrak{A}, \mathbb{P}) \rightarrow (S, \mathfrak{G})$, $(S, \mathfrak{G})$ Borelraum, μ σ -endl. Maß auf $(S, \mathfrak{G})$

$Z : (\Omega, \mathfrak{A}, \mathbb{P}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathfrak{B})$.

$f_{(Z,\theta)} : \mathbb{R} \times S \rightarrow \mathbb{R}_+$ sei $\lambda \otimes \mu$ -Dichte von $\mathbb{P}^{(Z,\theta)}$. Dann

Theorem

$$f_{\theta}(\vartheta) = \int_{\mathbb{R}} f_{(Z,\theta)}(z, \vartheta) dz \quad \text{ist } \mu\text{-Dichte von } \mathbb{P}^{\theta}$$

$$f_Z(z) = \int_S f_{(Z,\theta)}(z, \vartheta) d\vartheta \quad \text{ist } \lambda\text{-Dichte von } \mathbb{P}^Z$$

$$f_{Z|\theta=\vartheta}(z) = \frac{f_{(Z,\theta)}(z, \vartheta)}{f_{\theta}(\vartheta)} \quad \text{ist } \lambda\text{-Dichte von } \mathbb{P}^{Z|\theta=\vartheta}$$

$$f_{\theta|Z=z}(\vartheta) = \frac{f_{(Z,\theta)}(z, \vartheta)}{f_Z(z)} \quad \text{ist } \mu\text{-Dichte von } \mathbb{P}^{\theta|Z=z}$$

Bayes-Theorem für Dichten

Theorem (Bayes-Theorem für Dichten)

Situation von oben. Dann

$$(i) \quad f_{\theta|Z=z}(\theta) = \frac{f_{Z|\theta=\vartheta}(z)f_{\theta}(\vartheta)}{f_Z(z)}$$

$$(ii) \quad f_{Z|\theta=\vartheta}(z) = \frac{f_{\theta|Z=z}(\vartheta)f_Z(z)}{f_{\theta}(\vartheta)}$$

Beispiel

$\theta : (\Omega, \mathfrak{A}) \rightarrow (\mathbb{N}, \mathfrak{P}(\mathbb{N}))$, μ Zählmaß auf $(\mathbb{N}, \mathfrak{P}(\mathbb{N}))$.

$Z : (\Omega, \mathfrak{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathfrak{B})$.

Es gelte:

$$\theta \sim \text{Ber}(p_1), \quad p_0 := 1 - p_1$$

$$Z \sim \mathcal{N}(0, 1)(1 - \theta) + \mathcal{N}(100, 1)\theta$$

Gesucht: $f_{\theta|Z=z}$

Mit Bayes erhält man:

$$f_{\theta|Z=z}(\vartheta) = \frac{f_{Z|\theta=\vartheta}(z)f_{\theta}(\vartheta)}{f_Z(z)} = \begin{cases} \frac{p_0\varphi_{0,1}(z)}{p_0\varphi_{0,1}(z)+p_1\varphi_{100,1}(z)}, & \text{für } \vartheta = 0, \\ \frac{p_1\varphi_{100,1}(z)}{p_0\varphi_{0,1}(z)+p_1\varphi_{100,1}(z)}, & \text{für } \vartheta = 1 \end{cases}$$

False Discovery Rate (FDR)

Multiples Testproblem, n zu testende Hypothesen,
 $\varphi = (\varphi_i, i = 1, \dots, n)$ multiple Testprozedur.

V : (zufällige) Anzahl der Typ-1-Fehler

R : (zufällige) Anzahl von verworfenen Hypothesen insgesamt.

Definition

$$FDR(\varphi) = \mathbb{E}\left(\frac{V}{R \vee 1}\right)$$

heißt *False Discovery Rate (FDR)* von φ .

positive False Discovery Rate (pFDR)

Definition

Situation wie in obiger Definition.

$$pFDR(\varphi) = \mathbb{E}\left[\frac{V}{R} \mid R > 0\right]$$

heißt *positive False Discovery Rate (pFDR)* von φ .

Zweiklassen-Mischmodell

Definition (Zweiklassen-Mischmodell)

$(Z_1, H_1), \dots, (Z_n, H_n)$ iid.

Für $i = 1, \dots, n$: Z_i Teststatistik, H_i Indikatorvariable und

$$H_i \sim \text{Ber}(p_1)$$

$$Z_i | H_i \sim (1 - H_i)f_0 + H_i f_1$$

Bayesianische Interpretation

Theorem (Storey (2001))

Zweiklassen-Mischmodell, $\varphi = (\varphi_i, i = 1, \dots, n)$ multiple Testprozedur.

φ_i basierend auf Teststatistik Z_i mit Verwerfungsbereich C .

$$pFDR(C) := pFDR(\varphi) = \mathbb{P}[H_1 = 0 \mid Z_1 \in C]$$

Lokale FDR

Analog zu $pFDR(C) = \mathbb{P}[H = 0 \mid Z \in C]$ wird definiert:

Definition

Lokale *fdr*:

$$fdr(z) := \mathbb{P}[H = 0 \mid Z = z]$$

Bayes-Formel für Dichten:

$$fdr(z) = f_{H|Z=z}(0) = \frac{p_0 f_0(z)}{f_Z(z)}$$

Was kommt nun?

Im Zweiklassen-Mischmodell:

- 1 **Empirischer Bayes-Ansatz;**
Bewertungskriterium: $\widehat{\text{fdr}}(\mathbf{z})$
- 2 **Nichtparametrischer Bayes-Ansatz;**
Bewertungskriterium: $\mathbb{E}[\text{fdr}(\mathbf{z}) \mid \mathbf{Y}]$

Die fdr in empirischen Bayes-Methoden

Empirischer Bayes-Ansatz:

- 1 wähle p_0, f_0
- 2 schätze f aus den Daten
- 3 bilde $\widehat{fdr}(z_i) = \frac{p_0 f_0(z_i)}{\hat{f}(z_i)}$
- 4 ziehe Schlüsse aus dem Wert

Kritik: Subjektivität.

Der empirische Bayes-Ansatz

$n = 6033$ Gene.

Für jedes Gen: 50 Messungen in Normalgewebe, 52 in Tumorgewebe.

$T_i = 2$ -Stichproben-t-Statistik für Gen i

$F_{100}^t =$ Verteilungsfunktion zu t_{100} .

Zweiklassen-Mischmodell:

$$Z_i = \Phi^{-1}(F_{100}^t(T_i)) \quad (\text{z-Score})$$

$$H_i \sim \text{Ber}(p_1)$$

$$Z_i | H_i \sim (1 - H_i)f_0 + H_i f_1$$

Gesucht:

$\mathbf{P}_{\text{emp}}(z_i) :=$ Wahrscheinlichkeit, dass Gen mit z-Score z_i im Tumorgewebe andere Expression hat als im Normalgewebe.

Geschätzte fdr

Plan: Durchführung des obigen Punkteprogramms:

- 1 $f_0(z) := \varphi_{0,1}(z)$, $p_0 := 0.9$.
- 2 $\hat{f}$ Schätzung von f .
- 3

$$\widehat{fdr}(z) = \frac{0.9\varphi_{0,1}(z)}{\hat{f}(z)}$$

= Wahrscheinlichkeit für Nicht-Expression geg. $Z = z$

$$= 1 - \mathbf{P}_{\text{emp}}(z)$$

- 4 Schlüsse aus dem Wert ziehen:

Entscheidungsregel:

Erkläre Expressionsunterschied für Gen $i \Leftrightarrow \widehat{fdr}(z_i) \leq 0.2$

Der nichtparametrische Ansatz

Setting:

- n zu untersuchende Gene
- Alle wichtigen Informationen eines Gens in sog. z-Score enthalten.
- Pro Gen i je ein Kontrollscore Z_i^{null} und ein Effekt-Score Z_i^{mix}
 $Z^{\text{null}} = (Z_i^{\text{null}}, i = 1, \dots, n)$ **Null-Sample**,
 $Z^{\text{mix}} = (Z_i^{\text{mix}}, i = 1, \dots, n)$ **Mix-Sample**
- Umnummerierung:
 $Z_i, i = 1, \dots, n$ für Null-Sample;
 $Z_i, i = n + 1, \dots, 2n$ für Mix-Sample.

Fragestellung und Ansatz

Gesucht:

$P(z_i)$ = Wahrscheinlichkeit, dass Gen i im Tumorgewebe andere Expression hat als im Normalgewebe.

Idee:

Verbinde a priori Kenntnisse mit in Daten enthaltenen Informationen

$$H_i = \begin{cases} 0, & \text{falls Gen } i \text{ ohne Veränderung} \\ 1, & \text{falls Gen } i \text{ mit Veränderung} \end{cases}$$

Verteilungsannahmen

- 1 $Z_1, \dots, Z_n$ iid. und $Z_{n+1}, \dots, Z_{2n}$ iid.
- 2 Null-Sample und Mix-Sample unabhängig

Verteilungsannahmen

- 1 $Z_1, \dots, Z_n$ iid. und $Z_{n+1}, \dots, Z_{2n}$ iid.
- 2 Null-Sample und Mix-Sample unabhängig
- 3 Für $i \leq n$ (Null-Sample)

$$Z_i \sim f_0(Z_i)$$

Verteilungsannahmen

- 1 $Z_1, \dots, Z_n$ iid. und $Z_{n+1}, \dots, Z_{2n}$ iid.
- 2 Null-Sample und Mix-Sample unabhängig
- 3 Für $i \leq n$ (Null-Sample)

$$Z_i \sim f_0(Z_i)$$

- 4 Für $i > n$ (Mix-Sample)

$$Z_i \sim f(Z_i) = p_0 f_0(Z_i) + (1 - p_0) f_1(Z_i)$$

Verteilungsannahmen

- 1 $Z_1, \dots, Z_n$ iid. und $Z_{n+1}, \dots, Z_{2n}$ iid.
- 2 Null-Sample und Mix-Sample unabhängig
- 3 Für $i \leq n$ (Null-Sample)

$$Z_i \sim f_0(Z_i)$$

- 4 Für $i > n$ (Mix-Sample)

$$Z_i \sim f(Z_i) = p_0 f_0(Z_i) + (1 - p_0) f_1(Z_i)$$

- 5 also $\forall i$: $Z_i | H_i \sim f_0(1 - H_i) + f_1 H_i$

Verteilungsannahmen

- 1 $Z_1, \dots, Z_n$ iid. und $Z_{n+1}, \dots, Z_{2n}$ iid.
- 2 Null-Sample und Mix-Sample unabhängig
- 3 Für $i \leq n$ (Null-Sample)

$$Z_i \sim f_0(Z_i)$$

- 4 Für $i > n$ (Mix-Sample)

$$Z_i \sim f(Z_i) = p_0 f_0(Z_i) + (1 - p_0) f_1(Z_i)$$

- 5 also $\forall i$: $Z_i | H_i \sim f_0(1 - H_i) + f_1 H_i$

$Z \sim Z^{\text{mix}}$. Bayes-Regel liefert:

$$\mathbb{P}[H = 1 \mid Z, f_0, f_1, p_0] = \frac{p_1 f_1(Z)}{p_0 f_0(Z) + p_1 f_1(Z)} = \frac{p_1 f_1(Z)}{f(Z)} \quad (*)$$

Plan:

- Festlegen eines a priori Wahrscheinlichkeitsmodells für f_0, f_1, p_0 .
- Bestimmung der a posteriori Verteilungen $\mathbb{P}^{f_0|Y}, \mathbb{P}^{f_1|Y}, \mathbb{P}^{p_0|Y}$ gegeben alle Daten (=: Y).
- $\mathbf{P}(z_i) := \mathbb{E}\left[\frac{p_1 f_1(z_i)}{f(z_i)} \mid Y\right] \approx \frac{\mathbb{E}[p_1|Y] \mathbb{E}[f_1(z_i)|Y]}{\mathbb{E}[p_0|Y] \mathbb{E}[f_0(z_i)|Y] + \mathbb{E}[p_1|Y] \mathbb{E}[f_1(z_i)|Y]}$
- Aus $\mathbf{P}(z_i)$ Schlüsse ziehen.

Notationen

$$N_0 = \mathcal{N}(b, \sigma_0^2)$$

$$N_1 = \frac{1}{2}\mathcal{N}(-\tilde{b}, \tilde{\sigma}^2) + \frac{1}{2}\mathcal{N}(\tilde{b}, \tilde{\sigma}^2)$$

$$G_0(\cdot) = \sum_{k=1}^{\infty} \omega_k \delta_{\mu_k}(\cdot), \quad G_1(\cdot) = \sum_{k=1}^{\infty} \tilde{\omega}_k \delta_{\tilde{\mu}_k}(\cdot)$$

mit

$\mu_k \stackrel{iid.}{\sim} N_0$ und $\tilde{\mu}_k \stackrel{iid.}{\sim} N_1$,

$\sigma^2, \sigma_0^2, \tilde{\sigma}^2$ Invers-Gamma-verteilt, $b, \tilde{b}$ normalverteilt

$\omega_k, \tilde{\omega}_k$ unabh. zufällige reskalierte Gewichte aus $unif(0, 1)$

A priori Wahrscheinlichkeitsmodell

$$p_0 \sim \text{unif}(0.05, 1)$$

$$f_0(z) = \int \varphi_{\mu, \sigma^2}(z) dG_0(\mu) = \sum_{k=1}^{\infty} \omega_k \varphi_{\mu_k, \sigma^2}(z)$$

$$f_1(z) = \int \varphi_{\tilde{\mu}, \sigma^2}(z) dG_1(\tilde{\mu}) = \sum_{k=1}^{\infty} \tilde{\omega}_k \varphi_{\tilde{\mu}_k, \sigma^2}(z)$$

MCMC im hierarchischen Modell (1)

Darstellung als hierarchisches Modell:

$$Z_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma^2)$$

$$\mu_i \sim \begin{cases} G_0, & \text{falls } r_i = 0, \\ G_1, & \text{falls } r_i = 1 \end{cases}$$

$$r_i \sim \begin{cases} \delta_0, & \text{für } i = 1, \dots, n \\ \text{Ber}(p_1), & \text{für } i = n + 1, \dots, 2n \end{cases}$$

MCMC im hierarchischen Modell (2)

$\vartheta := (\sigma^2, \sigma_0^2, \tilde{\sigma}^2, b, \tilde{b}, \rho_0)$ und $\vartheta_\eta = \vartheta$ ohne Komponente η .

Eigenschaft von konjugierten a priori Verteilungen liefert:

$\mathbb{P}^{\rho_0}(Y, \vartheta_{\rho_0})$: Beta-Verteilung

$\mathbb{P}^{\sigma^2}(Y, \vartheta_{\sigma^2}), \mathbb{P}^{\sigma_0^2}(Y, \vartheta_{\sigma_0^2}), \mathbb{P}^{\tilde{\sigma}^2}(Y, \vartheta_{\tilde{\sigma}^2})$: Invers-Gamma-Verteilungen

$\mathbb{P}^b(Y, \vartheta_b), \mathbb{P}^{\tilde{b}}(Y, \vartheta_{\tilde{b}})$: Normal-Verteilungen

MCMC im hierarchischen Modell (3)

- Einige Überlegungen (μ_i sind diskret verteilt) liefern bedingte Verteilung der μ_i .
- erhalten so letztlich Realisierungen aus $\mathbb{P}^{G_0|Y}, \mathbb{P}^{G_1|Y}$
- damit Bestimmung von $\mathbb{E}[f_0 | Y], \mathbb{E}[f_1 | Y]$

Inferenz

Nach Idee oben:

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(z_i) &= \mathbb{E}\left[\frac{p_1 f_1(z_i)}{f(z_i)} \mid Y\right] = \int \frac{p_1 f_1(z_i)}{f(z_i)} d\mathbb{P}^{(f_0, f_1, p_0) \mid Y} \\ &= 1 - \mathbb{E}[fdr(z_i) \mid Y] \\ &\approx \frac{\mathbb{E}[p_1 \mid Y] \mathbb{E}[f_1(z_i) \mid Y]}{\mathbb{E}[p_0 \mid Y] \mathbb{E}[f_0(z_i) \mid Y] + \mathbb{E}[p_1 \mid Y] \mathbb{E}[f_1(z_i) \mid Y]} \end{aligned}$$

Empirischer Ansatz:

$$\mathbf{P}_{\text{emp}}(z_i) = \frac{\hat{p}_1 f_1(z_i)}{\hat{f}(z_i)} = 1 - \hat{f}dr(z_i)$$

Simulationsstudie - Wie gut ist $P(z)$?

Die Realität sehe so aus:

$$f_0 = \mathcal{N}(0, 1), f_1 = 0.5\mathcal{N}(-2, 1) + 0.5\mathcal{N}(2, 1), p_0 = 0.8; n = 10\,000$$

- Teilen die Werte $z_1, \dots, z_{10000}$ in Bins ein
- Ordnen Bin j die Anzahl $n_j = |\{k : z_k \in \text{Bin } j, H_k = 1\}|$ der Gene mit Veränderung zu
- Vergleich dieser Funktion (---) mit $P(z)$ (—)

$P(i)$ in Abhängigkeit vom wahren p_0

A posteriori Wahrscheinlichkeit für Expressionsunterschied in Abhängigkeit vom zugrunde liegenden wahren p_0 und dem z-Score.

Entscheidungsregel:

Gen mit Score z hat Expressionsunterschied $\Leftrightarrow P(z) > 0.5$.

p_0	z										
	-5.00	-4.00	-3.00	-2.00	-1.00	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
0.4	1.00	1.00	0.98	0.87	0.46	0.19	0.43	0.85	0.98	1.00	1.00
0.8	0.94	0.90	0.75	0.41	0.14	0.07	0.13	0.44	0.81	0.93	0.96
0.95	0.46	0.42	0.27	0.11	0.05	0.03	0.04	0.10	0.28	0.43	0.50

Empirischer und nichtparametrischer Ansatz in der Anwendung

Vergleich:

Dichte $f_{p_0|\mathcal{Y}}$ und Punktschätzer

$$\hat{p}_0 = 0.39$$

Ausblick

- Verlustfunktionen
- Entscheidungsregel

Ausblick

- Verlustfunktionen
- Entscheidungsregel
- Optimalität

Ausblick

- Verlustfunktionen
- Entscheidungsregel
- Optimalität

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!